

VACINAS CONTRA COVID-19 E TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS SÓLIDOS
COMISSÃO DE INFECÇÃO EM TRANSPLANTES (COINT) / ABTO

22/02/2021

Idealmente, para garantir melhor resposta a qualquer vacinação, o ideal é que as vacinas inativadas sejam aplicadas com intervalo mínimo de 14 dias antes do transplante de órgão sólidos.

Em relação às vacinas disponíveis contra Covid-19, no Brasil e no mundo, a COINT orienta que não há necessidade de intervalo de tempo entre a vacinação e o transplante de órgãos sólidos, tanto para o doador quanto para o receptor. As vacinas disponíveis contra a Covid-19 não são vacinas com vírus atenuado e estão indicadas, inclusive, para pacientes imunossuprimidos e após transplante de órgão sólidos.

Referências:

- 1- PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, 4ª edição, Brasília/DF, 15/02/2021
- 2- AASLD EXPERT PANEL CONSENSUS STATEMENT: VACCINES TO PREVENT COVID-19 INFECTION IN PATIENTS WITH LIVER DISEASE, disponível em:
<https://www.aasld.org/about-aasld/covid-19-and-liver>,
<https://www.aasld.org/sites/default/files/2021-02/AASLD-COVID19-VaccineDocument-February2021-FINAL.pdf>